

# CARTE DE SURVEILLANCE

**PATIENT** **KEVZARA®**  
(sarilumab)

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez. Consultez la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site de l'ANSM [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr).

- Cette carte contient des informations importantes de sécurité que vous devez connaître avant, pendant et après votre traitement par KEVZARA®.
- Pour plus d'informations, lisez la notice KEVZARA®.

**Montrez cette carte à tout médecin que vous consultez pour l'informer de votre traitement par KEVZARA® qui peut augmenter le risque d'infections graves, de neutropénie et de perforation intestinale.**

## INFECTIONS

KEVZARA® peut réduire la capacité de votre organisme à lutter contre les infections ce qui signifie qu'il peut faciliter l'apparition d'une infection ou aggraver une infection existante.

- Vous ne devez pas prendre KEVZARA® si vous souffrez d'une infection grave en cours : consultez votre médecin si vous avez des doutes.
- Un test de dépistage de la tuberculose doit être effectué avant de débuter un traitement par KEVZARA®.
- Indiquez à votre médecin si vous avez été vacciné(e) récemment ou allez bientôt recevoir un vaccin quel qu'il soit.

**Pendant le traitement, prévenez immédiatement votre médecin** si l'un des symptômes suivants survient : fièvre, sueurs, frissons, toux persistante, perte de poids, grande fatigue.

Demandez conseil à votre médecin afin de savoir si vous devez reporter votre prochaine administration, si vous présentez une infection quelle qu'elle soit au moment de la date prévue d'administration.

## NEUTROPENIE (baisse du nombre de globules blancs dans le sang)

Vous devrez effectuer des analyses de sang avant et pendant votre traitement : elles servent notamment à détecter une baisse du nombre de cellules sanguines appelées globules blancs.

## PERFORATION INTESTINALE

Les patients utilisant KEVZARA® sont susceptibles de développer des complications gastro-intestinales, qui peuvent devenir graves si elles ne sont pas traitées.

Avant de prendre KEVZARA®, informez votre médecin si vous avez eu une diverticulite (maladie du colon) ou un ulcère à l'estomac ou à l'intestin.

**Pendant le traitement, prévenez immédiatement votre médecin** en cas de fièvre et de douleur à l'estomac (ou au ventre) qui ne disparaît pas.

## DATES DE TRAITEMENT PAR KEVZARA®

Posologie de KEVZARA® :

Date d'instauration de KEVZARA® :



Nom du patient :



Nom du médecin :



Téléphone du médecin :

**Veillez à avoir en votre possession une liste de tous vos autres médicaments à chaque consultation d'un professionnel de santé.**

**Conservez cette carte avec vous pendant la durée du traitement et 2 mois après la dernière injection de KEVZARA®, des effets indésirables pouvant survenir quelques temps après votre dernière injection de KEVZARA®.**

SANOFI GENZYME 

Sanofi Genzyme et Regeneron s'engagent dans le programme de développement et la commercialisation de KEVZARA®

**0 800 222 555** Service & appel gratuits

7000018211-03/2018