



Toujeo[®]

insuline glargine 300U/mL

TOUJEO[®] 300 unités/mL SoloStar[®], solution injectable en stylo pré-rempli

TOUJEO[®] 300 unités/mL DoubleStar[®], solution injectable en stylo pré-rempli

Guide pour le patient et/ou son entourage

Diffusé sous l'autorité de l'ANSM

- **Votre médecin vous a prescrit TOUJEO®. Il vous a également remis ce document, contenant des informations relatives au bon usage de votre stylo TOUJEO® et au risque d'erreur médicamenteuse. Lisez-le attentivement ainsi que la notice et le mode d'emploi du stylo injectable avant d'utiliser ce médicament.**

1. Qu'est-ce que TOUJEO® 300 unités/mL ?

Le principe actif de ce médicament est l'insuline glargine. C'est une insuline basale qui permet de diminuer votre taux de sucre dans le sang (glycémie), en une injection par jour. L'insuline glargine est disponible en deux concentrations :

- **100 unités/mL** : disponible soit sous le nom de LANTUS® (en flacon, cartouche) ou LANTUS® Solostar® (en stylo pré-rempli), soit sous le nom d'ABASAGLAR® (en cartouche et en stylo pré-rempli)
- **300 unités/mL** : disponible en stylos pré-remplis sous le nom de TOUJEO®.

⚠ Il existe 2 types de stylos TOUJEO® :

	TOUJEO® 300 unités/mL SoloStar®	TOUJEO® 300 unités/mL DoubleStar®
Stylo pré-rempli		
Sélection de la dose	Permet de délivrer l'insuline par paliers d'1 unité d'insuline	Permet de délivrer l'insuline par paliers de 2 unités d'insuline
Quantité totale - Volume	450 unités - 1,5 mL	900 unités - 3 mL

La sélection de la dose d'insuline avec :

- **TOUJEO® 300 unités/mL SoloStar® se fait d'unité en unité.**
- **TOUJEO® 300 unités/mL DoubleStar® se fait de 2 unités en 2 unités.**

La dose qui sera délivrée est celle qui apparaît dans la fenêtre d'affichage de dose.

2. Informations importantes à connaître avant d'utiliser TOUJEO® 300 unités/mL

- Vérifiez toujours le nom et le type d'insuline figurant sur la boîte du médicament et sur l'étiquette du stylo pré-rempli.
- Le changement d'une insuline à une autre ne doit se faire qu'après prescription par votre médecin.
- **La nouvelle dose recommandée par votre médecin doit toujours être respectée.** Même si TOUJEO® (insuline glargine 300 unités/mL) contient la même substance active que l'insuline glargine 100 unités/mL, ces médicaments **ne sont pas interchangeables sans ajustement de dose.** Ces médicaments ne sont pas identiques (bioéquivalents) et votre médecin pourra être amené à vous prescrire une dose plus importante de TOUJEO®.

⚠ N'effectuez pas de recalcul de dose et débutez le traitement avec le nombre d'unités écrit sur votre ordonnance.

- Utilisez toujours le sélecteur de doses du stylo TOUJEO® (SoloStar® ou DoubleStar®) pour sélectionner la dose à administrer.
- Votre glycémie doit être surveillée étroitement pendant la période de changement d'une insuline à une autre et les premières semaines qui suivent.

Si vous avez des questions au sujet de TOUJEO® 300 unités/mL, contactez votre médecin ou votre pharmacien.

Avant d'injecter TOUJEO® :

Lisez attentivement le mode d'emploi du stylo inclus dans la notice de TOUJEO® ou disponible sur la base de données publique des médicaments <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/re. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d'information.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le portail de signalement des événements sanitaires indésirables du ministère chargé de la santé <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>. Pour plus d'information, consulter la rubrique « Déclarer un effet indésirable » sur le site Internet de l'ANSM : <https://ansm.sante.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.

