Xenpozyme®
(olipudase alfa)

Guide à l'attention des professionnels de santé - Perfusion à domicile

Ce guide contient des informations de sécurité importantes destinées au prescripteur et à l'infirmier(-ère) à domicile.

Veuillez le lire attentivement avant de prescrire ou de réaliser une perfusion à domicile d'olipudase alfa.

Lorsque vous décidez de prescrire des perfusions d'olipudase alfa à domicile, veuillez remettre un exemplaire de ce guide au patient ou au prestataire de santé, à l'attention de l'infirmier(-ère) à domicile.

Médecin prescripteur :

- Nom : .....
- Contact (téléphone) : .....

Hôpital/Centre :

- Nom : .....
- Contact en cas d'urgence (téléphone) : .....

Pour une information complète, veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur le site internet ansm.sante.fr

Diffusé sous l'autorité de l'ANSM.

2509231657l6WM - 10/2025

Version 3 - Octobre 2025

Sommaire

1 - Objectifs **4**

2 - Conditions requises et organisation de l'administration d'olipudase alfa à domicile

2A. Évaluation médicale du patient avant le passage à la perfusion à domicile 4

2B. Organisation de la perfusion à domicile 4

2C. Équipement et matériels 5

3 - Administration d'olipudase alfa

3A. Préparation 6

3B. Reconstitution 7

3C. Modalité de dilution 7

3D. Dilution 8

3E. Administration 9

4 - Surveillance **11**

5 - Déclaration des évènements indésirables **12**

6 - Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa **13**

1 – Objectifs

- Ce guide est conçu pour aider les professionnels de santé à réduire et à prendre en charge les risques associés à la perfusion à domicile d'olipudase alfa:
  - Immunogénicité : réaction associée à la perfusion (RAP), hypersensibilité systémique, y compris l'anaphylaxie, hypersensibilité médiée par les anticorps anti-médicaments (ADA),
  - Erreurs médicamenteuses dans le cadre de la perfusion à domicile.

2 – Conditions requises et organisation de l'administration d'olipudase alfa à domicile

2A. Évaluation médicale du patient avant le passage à la perfusion à domicile

- La décision de passer les patients à des perfusions à domicile doit être prise par le médecin prescripteur.
- La perfusion à domicile ne peut être envisagée que pour les patients sous dose d'entretien (et non pendant l'escalade de dose) qui tolèrent bien leurs perfusions.
- L'administration d'olipudase alfa doit être supervisée par un professionnel de santé **formé aux mesures d'urgence et ayant accès à une assistance médicale appropriée** pour prendre en charge les réactions graves. Les patients et/ou les aidants doivent en être informés.
- Les aspects cliniques (dose de traitement et planification des perfusions) et logistiques doivent être abordés avec le patient et/ou l'aidant par le médecin prescripteur avant de passer à la perfusion à domicile.
- En cas de réactions d'hypersensibilité sévères, les perfusions suivantes doivent impérativement avoir lieu dans un cadre clinique approprié disposant du matériel de réanimation nécessaire.

2B. Organisation de la perfusion à domicile

- **La dose et le débit de perfusion** doivent rester identiques à ceux utilisés dans le cadre clinique approprié pendant la perfusion du patient à domicile et ne doivent pas être modifiés sans la supervision du médecin prescripteur.
- En cas de doses manquées ou de retard de perfusion, le médecin prescripteur doit être contacté et les perfusions suivantes pourraient devoir être effectuées dans un cadre hospitalier. Une dose est considérée comme manquée lorsqu'elle n'est pas administrée dans les 3 jours suivant la date prévue.
- Avant l'administration du traitement, il faut s'assurer de la disponibilité des éléments suivants :
  - Accès à une assistance médicale appropriée en cas d'urgence,
  - Informations sur le patient et les modalités de perfusion (par exemple, dose d'entretien prescrite, poids, débit de perfusion, volume reconstitué, prémédication, médicaments d'urgence),

- Coordonnées du médecin prescripteur (disponibles sur la carte patient),
- Matériel nécessaire et environnement adapté (environnement propre avec électricité, eau courante, ligne téléphonique, réfrigération).

2C. Équipement et matériels

- 1 pompe à perfusion, adaptée à la seringue ou à la poche de perfusion selon la dose d'olipudase alfa.
- Flacons d'olipudase alfa (20 mg par flacon) ; à conserver au réfrigérateur à une température comprise entre 2°C et 8°C.
- Eau Pour Préparations Injectables (EPPI) pour la reconstitution d'olipudase alfa.
- Solution de chlorure de sodium (NaCl) 0,9 %, 50 mL,100 mL ou 250 mL, selon la dose d'olipudase alfa, pour la préparation de la solution finale pour l'administration en intraveineuse (IV).
- Solution de NaCl 0,9 %, 50 mL pour le rinçage de la ligne de perfusion après l'administration de la perfusion.
- Solution antiseptique type chlorhexidine alcoolique à 0,5 % (70 %).
- Nombre approprié de seringues de 2 mL, 10 mL et 50 mL en fonction du nombre de flacons d'olipudase alfa à reconstituer. L'utilisation de seringues pour la préparation de la solution finale doit également être envisagée.
- Aiguilles hypodermiques stériles (1,1 x 40 mm, 2 aiguilles pour 4 flacons).
- 1 cathéter veineux court ou 1 aiguille pour chambre implantable, le cas échéant.
- Filtre en ligne de 0,2 µm à faible fixation protéique.
- Dispositif d'administration de la perfusion (ligne de perfusion).
- Ruban adhésif.
- Compresses stériles pour le nettoyage de la peau.
- Conteneur DASRI.
- Un accès pour le lavage des mains.
- Garrot.
- Matériel supplémentaire en cas d'utilisation d'un dispositif d'accès veineux central selon le protocole de soins en vigueur (ou prescrit).
- Prémédication (le cas échéant, selon la prescription).
- Traitement d'urgence (selon la prescription).

Vérifiez si vous avez suffisamment de matériel et commandez-en si nécessaire.

3 – Administration d'olipudase alfa

3A. Préparation

- Évaluer l'état clinique du patient le jour de la perfusion :
  - Si le patient présente un effet indésirable non résolu depuis la perfusion précédente ou souffre d'une maladie aiguë, veuillez contacter le médecin prescripteur.
  - La perfusion peut être reportée, selon l'évaluation clinique du médecin prescripteur.
  - Si une perfusion est manquée ou retardée (c'est-à-dire si elle n'est pas administrée dans les 3 jours suivant la date prévue), contacter le médecin prescripteur qui ajustera le calendrier de traitement en conséquence. Une nouvelle escalade de dose, réalisée dans un cadre clinique approprié, sera nécessaire si des perfusions ont été manquées.
- Calculer la dose du patient (en mg) (cf. feuille de calcul à la fin de ce document)

Dose du patient (mg) = poids du patient (kg*) x dose (mg/kg)

* Le poids corporel réel doit être utilisé pour les patients avec un indice de masse corporelle (IMC) ≤ 30.
Pour les patients dont l'indice de masse corporelle (IMC) est > 30 kg/m^2, la quantité d'olipudase alfa nécessaire à la perfusion est déterminée sur la base du poids corporel théorique et non réel. Le poids corporel théorique est calculé avec la formule suivante : 30 (kg/m^2) x taille réelle^2 (m^2).

- Déterminer le nombre de flacons à reconstituer en fonction du poids du patient et de la dose prescrite.

Nombre de flacons à reconstituer = dose du patient (mg) ÷ 20 mg/flacon

- Si le nombre de flacons comprend une décimale, arrondissez au nombre entier supérieur.
- Sortez le nombre nécessaire de flacons du réfrigérateur et les mettre de côté pendant environ 20 à 30 minutes pour leur permettre d'atteindre la température ambiante.
- Poser la voie veineuse.

3B. Reconstitution

Les étapes de reconstitution doivent être réalisées dans des conditions aseptiques. Ne PAS utiliser de filtres pendant la reconstitution.

IMPORTANT : Empêchez la formation de mousse qui réduirait la quantité d'enzyme active !

1. Dans chaque flacon d'olipudase alfa, injecter lentement, contre la paroi, 5,1 mL d'EPPI.



2. Mélangez doucement en faisant rouler le flacon entre les paumes des mains.

3. La solution obtenue doit être limpide et incolore. Les flacons présentant des particules opaques ou une coloration anormale ne doivent pas être utilisés.

4. La solution obtenue contient 4 mg d'olipudase alfa pour 1 mL.

D'un point de vue microbiologique, le médicament reconstitué doit être utilisé immédiatement. Si le médicament n'est pas utilisé immédiatement pour réaliser la dilution, les durées et conditions de conservation avant dilution relèvent de la responsabilité de l'utilisateur et ne doivent pas dépasser 24 heures à une température comprise entre 2°C et 8°C ou 12 heures à température ambiante (jusqu'à 25°C).

3C. Modalités de dilution (cf. feuille de calcul à la fin de ce document)

- Calculer le volume d'olipudase alfa reconstitué nécessaire pour la perfusion, en utilisant la formule suivante :

Volume (mL) = dose du patient (mg) ÷ 4 (mg/mL)

Exemple 1 : Un patient avec un poids corporel de 65 kg recevant une dose d'entretien de 3 mg/kg :

- La dose d'olipudase alfa nécessaire par perfusion est de 65 kg x 3 mg/kg = 195 mg
- Par conséquent, le volume d'olipudase alfa reconstitué nécessaire par perfusion est de 195 mg ÷ 4 mg/mL = 48,75 mL

Exemple 2 : Un patient avec un poids corporel de 101 kg (IMC 35 kg/m^2) recevant une dose d'entretien de 3 mg/kg :

- Rappel : si l'IMC du patient est > 30 kg/m^2, la quantité d'olipudase alfa nécessaire à la perfusion est déterminée sur la base du poids corporel théorique et non réel.
- Pour un patient avec un poids corporel de 101 Kg, une taille de 1,70 m, le poids corporel théorique à utiliser est de 86,7 kg (30 kg/m^2 x 1,70 m^2)
- La dose d'olipudase alfa nécessaire par perfusion est de 86,7 kg x 3 mg/kg = 260 mg
- Par conséquent, le volume d'olipudase alfa reconstitué nécessaire par perfusion est de 260 mg ÷ 4 mg/mL = 65 mL

3D. Dilution

Les étapes de dilution doivent être réalisées dans des conditions aseptiques. Ne PAS utiliser de filtres pendant la dilution.

IMPORTANT : Éviter la formation de mousse pendant les étapes de dilution. Dans la mesure du possible, utilisez des poches de perfusion souples pour minimiser la formation de mousse.

- Déterminez le volume total de la perfusion et utilisez la poche de perfusion (pré-remplie ou vide) de taille appropriée.

POUR LES PATIENTS PEDIATRIQUES :

Pour une dose d'entretien de **3 mg/kg**, le volume total de perfusion peut aller de **50 à 250 mL**, en fonction du poids corporel de l'enfant.

Le volume total de la solution de perfusion et de la poche pré-remplie de solution de NaCl à 0,9 % sont décrit dans le tableau 1.

Tableau 1. Volume de la solution finale d'olipudase alfa pour l'administration d'une dose d'entretien chez le patient pédiatrique (3 mg/kg)

Poids corporel (kg)	Volume total de perfusion (mL)	Volume de la poche (mL)
≥ 3 et < 10	50	Poche de perfusion, 50 mL
≥ 10 et < 20	100	Poche de perfusion, 100 mL
≥ 20	250	Poche de perfusion, 250 mL

POUR LES PATIENTS ADULTES :

Les doses d'entretien sont administrées à l'aide de poches de perfusion de 100 mL uniquement.

➙ Si des **poches de perfusion pré-remplies** avec une solution de NaCl à 0,9 % sont utilisées :

1. Prélevez le volume de solution de NaCl à 0,9 % qui est égal au volume calculé d'olipudase alfa à diluer (par exemple, si 10 mL de solution reconstituée sont nécessaires pour la perfusion, il faut d'abord retirer et jeter 10 mL de solution de NaCl).



2. Avec précaution, prélever la quantité calculée d'olipudase alfa reconstituée à l'aide d'une seringue.

3. Injecter délicatement la solution d'olipudase alfa reconstituée dans la poche de perfusion.

➙ Si **des poches de perfusion vides** sont utilisées :

1. Prélever avec précaution la quantité calculée de solution d'olipudase alfa à diluer à l'aide d'une seringue.

2. Injecter délicatement la solution d'olipudase alfa reconstituée dans la poche de perfusion.

3. Ajoutez lentement la quantité suffisante de solution injectable de NaCl à 0,9% pour obtenir le volume total de perfusion requis.

- **Retournez délicatement la poche de perfusion pour le mélanger**. Ne pas agiter. Comme il s'agit d'une solution protéique, une légère floculation (décrite comme de fines fibres translucides) se produit parfois après dilution.
- **Adapter la tubulure de perfusion et le filtre 0,2 µm à faible fixation protéique**. Purger l'ensemble de la ligne de perfusion avec la solution d'olipudase alfa diluée.

D'un point de vue microbiologique, le médicament dilué doit être utilisé immédiatement. Si le médicament n'est pas utilisé immédiatement après la dilution, les durées et conditions de conservation pendant l'utilisation relèvent de la responsabilité de l'utilisateur et ne doivent pas dépasser 24 heures à une température comprise entre 2°C et 8°C ou 12 heures à température ambiante (jusqu'à 25°C).

3E. Administration

Olipudase alfa est exclusivement réservé à une utilisation par voie intraveineuse.

- La solution de perfusion doit être administrée à travers un filtre en ligne à faible fixation protéique de 0,2 µm.
- Les débits de perfusion doivent être augmentés progressivement pendant la perfusion uniquement en l'absence de RAP.

POUR LES PATIENTS PEDIATRIQUES :

Utiliser les débits de perfusion indiqués dans le tableau 2 selon le poids de l'enfant.

Le passage au palier supérieur s'effectue toutes les 20 minutes (± 5 minutes) et en l'absence de RAP.

Tableau 2. Débits de perfusion d'olipudase alfa pour les patients pédiatriques avec une dose d'entretien de 3 mg/kg

3 kg ≤ Poids de l'enfant < 10 kg						
Dose (mg/kg)	Volume total de perfusion	Palier			Débit final 1mg/kg/h	Durée approximative totale de la perfusion
		1 0,1mg/kg/h	2 0,3mg/kg/h	3 0,6mg/kg/h		
3	50 mL	1,7 mL/h	5 mL/h	10 mL/h	17 mL/h	220 min

10 kg ≤ Poids de l'enfant < 20 kg						
Dose (mg/kg)	Volume total de perfusion	Palier			Débit final 1mg/kg/h	Durée approximative totale de la perfusion
		1 0,1mg/kg/h	2 0,3mg/kg/h	3 0,6mg/kg/h		
3	100 mL	3,3 mL/h	10 mL/h	20 mL/h	33 mL/h	220 min

Poids de l'enfant ≥ 20 kg						
Dose (mg/kg)	Volume total de perfusion	Palier			Débit final 1mg/kg/h	Durée approximative totale de la perfusion
		1 0,1mg/kg/h	2 0,3mg/kg/h	3 0,6mg/kg/h		
3	250 mL	8,3 mL/h	25 mL/h	50 mL/h	83,3 mL/h	220 min

POUR LES PATIENTS ADULTES :

Utilisez les débits de perfusion indiqués dans le **tableau 3**.

Le passage au palier supérieur s'effectue toutes les 20 minutes (± 5 minutes) et en l'absence de RAP.

Tableau 3. Débits de perfusion d'olipudase alfa pour les patients adultes avec une dose d'entretien de 3mg/kg

Dose (mg/kg)	Étapes de la perfusion			Durée totale approximative de la perfusion (minutes)
	Palier	Débit (mL/h)	Durée (minutes)	
3	1	3.3	20	220
	2	10	20	
	3	20	20	
	Débit final	33.3	160	

- Une fois la perfusion terminée, la ligne de perfusion doit être rincée avec une solution injectable de NaCl à 0,9 % en utilisant le même débit de perfusion que celui utilisé pour la dernière partie de la perfusion.

4 – Surveillance

Les signes et les symptômes de Réactions Associées à la Perfusion (RAP) doivent être étroitement surveillés pendant la perfusion et pendant une période de temps appropriée après la perfusion, en fonction de l'évaluation clinique.

Les patients doivent être informés des symptômes potentiels d'hypersensibilité/ d'anaphylaxie et qu'ils doivent solliciter des soins médicaux immédiats en cas d'apparition de symptômes.

Durant les essais cliniques, les RAP sont généralement survenues entre le moment de la perfusion et jusqu'à 24 heures après la fin de la perfusion.

Les symptômes de RAP les plus fréquemment rapportés chez les patients adultes étaient : céphalées, nausées, urticaire, arthralgie, myalgie, fièvre, prurit, vomissements, douleurs abdominales, érythème et fatigue.

Les symptômes de RAP les plus fréquemment rapportés chez les patients pédiatriques étaient : fièvre, urticaire, vomissements, céphalées, nausées, rash, protéine C-réactive augmentée, douleurs abdominales, érythème, ferritine sérique augmentée et prurit.

Les symptômes de RAP liés à l'hypersensibilité les plus fréquemment rapportés étaient : urticaire, prurit, érythème et rash.

La conduite à tenir en cas de RAP doit être basée sur la sévérité des signes et des symptômes et peut inclure une interruption temporaire de la perfusion d'olipudase alfa, une diminution du débit de perfusion et/ou un traitement médical approprié.

- **Si une RAP ou une HYPERSENSIBILITÉ SYSTÉMIQUE, y compris l'ANAPHYLAXIE, se produisent :**
  - **Arrêter immédiatement la perfusion** et instaurer un traitement médical approprié.
  - Contacter le médecin prescripteur et/ou appeler le numéro d'urgence national.
  - Le traitement par olipudase alfa ne doit **pas être poursuivi à domicile**.
  - Les perfusions suivantes doivent impérativement avoir lieu dans un cadre clinique approprié disposant du matériel de réanimation nécessaire et une nouvelle escalade de dose pourra être envisagée.

5 – Déclaration des évènements indésirables

▼ ***Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.***

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté et/ou erreur médicamenteuse et/ou exposition au cours de la grossesse ou de l'allaitement auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur https://signalement.social-sante.gouv.fr/

Par ailleurs, vous pouvez également signaler tout effet indésirable survenu durant l'utilisation d'olipudase alfa au Service de Pharmacovigilance de Sanofi en contactant :

Sanofi Winthrop Industrie
82, avenue Raspail
94250 Gentilly

Pour contacter l'information médicale :
Par internet : https://www.sanofimedicalinformation.com
Par téléphone du lundi au vendredi, de 9h à 18h aux numéros suivants :

Depuis la métropole : **0 800 394 000** Service & appel gratuits

Depuis les DROM-COM : **0 800 626 626** Service & appel gratuits

6 – Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa® : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Feuille de calcul et surveillance de la perfusion à domicile d'olipudase alfa

<table>
<tr><th colspan="3">Perfusion à domicile d'olipudase alfa : calcul de dose et préparation de la solution</th></tr>
<tr><td>Identification du patient :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Date de Perfusion :

Numéro de perfusion :</td><td>Numéro de lot</td><td>Numéro de lot</td></tr>
<tr><td>Y a-t-il plus de 17 jours d'écart entre cette perfusion et la précédente ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, contactez le médecin prescripteur</td><td colspan="2">Le patient a-t-il signalé des effets indésirables depuis la dernière perfusion ?

OUI ☐ NON ☐

Si OUI, veuillez effectuer une déclaration de pharmacovigilance selon la procédure en vigueur et reportez-vous à la notice "réactions à la perfusion"</td></tr>
<tr><td colspan="3">Posologie : 3mg/kg ☐
Volume total de perfusion :
50 mL (poche) ☐ 100 mL (poche) ☐ 250 mL (poche) ☐</td></tr>
<tr><td>Poids du patient :
..... kg

Taille du patient =
..... m</td><td colspan="2">IMC du patient = ... (poids du patient en kg) ÷ .....
(taille du patient en mètres)² = ... kg/m²
Si l'IMC du patient est > 30, calculez le poids théorique sur la base d'un IMC de 30 et utilisez le poids théorique pour calculer la bonne dose d'olipudase alfa : Poids théorique (kg) = (taille du patient en mètres)² x 30
Si IMC > 30, Poids théorique = (..... m)² x 30 = ... kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dose du patient = ... (poids en kg ou poids théorique si IMC > 30) x .....
(posologie en mg) = ... mg d'olipudase alfa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volume d'olipudase alfa à prélever et diluer : ..... mg ÷ 4 = ... mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prémédication :</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identification IDEL</td></tr>
</table>

Veuillez refaire le calcul si le poids corporel du patient a changé ou si la dose prescrite a été modifiée par le médecin prescripteur.

Perfusion à domicile d'olipudase alfa[0] : administration et surveillance						
Pour le protocole de perfusion, reportez-vous aux tableaux des débits déterminés selon le poids et l'âge						
Prémédication éventuelle : OUI ☐ NON ☐						
Heure	Traitements	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
Administration et surveillance						
Heure	Débit	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
	.....mg/kg/h .....mL/h					
Rinçage de la ligne de perfusion						
Heure	Débit et volume	Fréquence cardiaque	Tension artérielle	Température	Fréquence respiratoire	Observations

Sanofi Winthrop Industrie
82 avenue Raspail, 94250 Gentilly
www.sanofi.fr

INFORMATION MÉDICALE ET PHARMACOVIGILANCE

Par téléphone du lundi au vendredi, de 9h à 18h aux numéros suivants :

0 800 394 000 Service & appel gratuits — Métropole

0 800 626 626 Service & appel gratuits — DROM-COM

FORMULAIRE DE CONTACT

www.sanofimedicalinformation.com/s/?language=fr

250923165716WM - 10/2025