




LA COQUELUCHE



La coqueluche peut-être une maladie grave chez les nourrissons, la femme enceinte et les personnes âgées¹

**1 L'UNE DES
ÈRES
causes de décès**
par infection bactérienne chez
les nourrissons entre 10 jours
et deux mois de vie.²



Hospitalisation
systématique des
moins de 3 mois³

**2 ÈME maladie la
plus
contagieuse** >
après la rougeole⁴

1 personne
atteinte de
coqueluche
en contamine **15⁵**

**Comment
se transmet-elle ?**



**Principalement par les
gouttelettes aériennes
provoquées par la
toux.¹**



**La maladie se manifeste
par une toux surnommée...
Le « Chant du coq »**

devenant quinteuse, épuisante et
répétée, de jour comme de nuit et
durant plusieurs semaines.¹

1. Vaccination info service. La coqueluche. Disponible sur: <https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Coqueluche>

2. Floret D. Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique, Groupe francophone de réanimation et urgence pédiatrique. « Les décès par infection bactérienne communautaire. Enquête dans les services de réanimation pédiatrique français. » Arch Pédiatr 2001 ; 8 suppl 4 : 705-11

3. Inserm. La coqueluche. Disponible sur : <https://www.inserm.fr/dossier/coqueluche/>

4. Santé sur le net. Rougeole. Disponible sur: https://www.bing.com/search?q=sant%C3%A9+sur+le+net+rougeole&cid=988c3cc7736443ef9554828b150b341b&gs_lcrp=EgRIZGdIKgYIABBFgDkyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAAYQDIGCAQQA

AMgYIBRAAGEAyBggCEAAAYQDIGCAEQABhAMgYICBAAGEAyCagJEOKHGPxV0gEIMzkzOWowaJSoAgCwAga&FORM=ANAB01&PC=U531

5. Cohen R et al. Pertussis vaccination coverage among French parents of infants after 10 years of cocoon strategy. Médecine et maladies infectieuses 46 (2016) 188-193.

Transmission
par un membre de la
famille dans près de

9 cas sur 10¹



L'importance de
protéger les
nourrissons contre
la coqueluche

La HAS recommande la **vaccination des femmes enceintes** pendant la grossesse contre la **coqueluche** dans le but de prévenir la coqueluche chez les nouveau-nés et les très jeunes nourrissons avant leur schéma de primovaccination par le transfert transplacentaire d'anticorps maternels.²

LA VACCINATION DE LA FEMME ENCEINTE CONTRE LA COQUELUCHE

- Est recommandée dès le 2^{ème} trimestre de grossesse, de préférence entre **20 et 36 semaines d'aménorrhée**
- Est recommandée à **chaque grossesse**
- **Peut protéger** les nouveau-nés **pour 1 à 3 mois** contre la coqueluche²



VÉRIFIER LE STATUT VACCINAL DE LA FEMME ENCEINTE AVANT DE VÉRIFIER CELUI DE L'ENTOURAGE (stratégie du cocooning)⁴

La vaccination de l'entourage s'appliquera :

- En l'**absence de la vaccination contre la coqueluche** de la femme enceinte
- En cas de naissance moins d'un mois après la vaccination (ex : **naissance prématurée**)



1. Santé Publique France. La coqueluche disponible sur <https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/coqueluche>

2. Kilgore, P. E., Salim, A. M., Zervos, M. J., & Schmitt, H. J. (2016). Pertussis: Microbiology, Disease, Treatment, and Prevention. Clinical microbiology reviews, 29(3), 449–486. <https://doi.org/10.1128/CMR.00083-15>

3. Haute Autorité de Santé - Recommandation vaccinale contre la coqueluche chez la femme enceinte. Disponible sur : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3084228/fr/recommandation-vaccinale-contre-la-coqueluche-chez-la-femme-enceinte

4. Calendrier des vaccinations. Disponible sur : <https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal>